



## แนวทางการตรวจสอบอาการมินเมา

ด้วยมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ บัญญัติห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอาการมินเมา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรค โดยคำแนะนำของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงออกแนวทางการตรวจสอบอาการมินเมา ดังนี้

### ๑. บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาการมินเมา

๑.๑ บุคคลที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณ ที่ส่งผลให้เกิดการบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจน ในการ ควบคุมการทรงตัว และการเคลื่อนไหวของร่างกาย (เช่น เดินเซ หรือยืนลำบาก เป็นต้น) หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวาจา จนอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อย

### ๑.๒ บุคคลที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย และมีอาการร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

#### ๑.๒.๑ อาการทางกายภาพที่สังเกตได้ชัดเจน ได้แก่

(ก) ตาแดงกำ หรือมีอาการตากระตุก

(ข) การควบคุมการเคลื่อนไหวบกพร่องอย่างชัดเจน เช่น เดินเซ เดินไม่ตรงทาง ยืนลำบาก ล้มเซ หรือมือสั่นอย่างเห็นได้ชัด

#### ๑.๒.๒ อาการทางวาจาและพฤติกรรม

(ก) พูดไม่ชัดเจน พูดอ้อแอ้ พูดรวบคำ หรือพูดซ้ำๆ กวนไปมา

(ข) มีภาวะอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย แสดงอารมณ์ก้าวร้าว หรือลวนลามผู้อื่น

(ค) กล่าววาจาในลักษณะข่มขู่หรือยั่วให้เกิดความไม่สงบ

### ๒. วิธีการตรวจสอบอาการมินเมา สามารถดำเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ การแตะจมูกตัวเอง ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมินเมาหลับตา ยื่นแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออกไป จากนั้นให้ออช็อค และนำนิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไม่ลืมตา หากบุคคลนั้นไม่สามารถนำนิ้วแตะที่ปลายจมูกได้โดยพลาดเป้าเกินกว่าหนึ่งเซนติเมตร หรือมีอาการมือสั่นอย่างเห็นชัดเจนพยายามแตะจมูก ให้ถือว่าเป็นอาการมินเมา

๒.๒ การเดินต่อเท้า ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมินเมาเดินสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าสลับก้าว แล้วหันตัวด้วยเท้าหนึ่งข้าง จากนั้นเดินสลับเท้าแบบส้นเท้าชิดปลายอีกสลับก้าว หากมีการแสดงความผิดปกติดังต่อไปนี้ร่วมกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ในระหว่างดำเนินการ ให้ถือว่าเป็นอาการมินเมา

๒.๒.๑ ไม่สามารถเดินต่อเท้าโดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๒ ก้าวออกนอกเส้น หรือเดินเซชัดเจน

๒.๒.๓ ใช้แขนช่วยพยุงตัวเพื่อทรงตัว (กางแขนออก)

๒.๒.๔ หยุดเดินก่อนครบสลับก้าว

๒.๒.๕ ไม่สามารถหันตัวได้อย่างถูกวิธี

๒.๓ การยืนขาเดียวและนับเลข ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมินเมายืนตัวตรง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นประมาณสิบห้าเซนติเมตร และเริ่มนับเลขตั้งแต่หนึ่งพันเป็นต้นไป (๑๐๐๑, ๑๐๐๒, ...) จนกว่าจะครบสามสิบวินาที จนกว่าจะครบสามสิบวินาที หากตัวเซ วางเท้าลง เขย่ง หรือใช้แขนทรงตัว ให้ถือว่าเป็นบุคคลดังกล่าวมีอาการมินเมา หากมีการแสดงความผิดปกติดังต่อไปนี้ร่วมกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างดำเนินการ ให้ถือว่าเป็นอาการมินเมา

๒.๓.๑ วางเท้าลงกับพื้นก่อนครบสามสิบวินาที

๒.๓.๒ ใช้แขนช่วยพยุงตัวเพื่อทรงตัว (กางแขนออก)

๒.๓.๓ ตัวเซหรือโยกตัวอย่างชัดเจนขณะยืน

๒.๓.๔ เขย่งเท้าด้วยข้างที่อยู่กับพื้น



<https://shorturl-ddc.moph.go.th/ZpaML>

วิธีตรวจสอบและประเมินอาการมินเมา