



มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าของ อปท.



องค์การอนามัยโลกประกาศ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ



พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบล่า สายพันธุ์ Bundibugyo
มีอัตราป่วยตายสูง



โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 9
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2558



ประกาศให้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ
สาธารณรัฐยูกันดา เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผล 21 พ.ค. 2569



นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายจอร์จ สัมพันธ์รัตน์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายธีรุต ศุภวิบูลย์ผล
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. ให้ อปท. เฝ้าระวัง & คัดกรอง

สนับสนุนการตรวจเข้มผู้เดินทางจากหรือ
ผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีเหตุสงสัย
ให้ แยกกัก / กักกัน / คุมไว้สังเกต
อย่างน้อย 21 วัน

2. บูรณาการข้ามหน่วยงาน

ประสานงานระดับพื้นที่ร่วมกับ ด้านควบคุมโรคฯ,
ตม., ท่าอากาศยาน, ฝ่ายปกครอง
และความมั่นคง เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ถิ่นที่อยู่ของผู้เดินทาง

3. อปท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แจ้งเตือนประชาชน ขอความร่วมมือ
การเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงและเน้นย้ำ
การสังเกตอาการหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง



เฝ้าระวัง กักกัน ควบคุม ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศ
ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย/
ประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค ภายใน 21 วัน



พบอาการต้องสงสัย:

ไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน
ท้องเสีย เลือดออกผิดปกติ



ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อทันที
ภายใน 3 ชั่วโมง



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่มา: ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค
หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สร 0410.7/ว 529 ลง 22 พ.ค. 2569



โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

แนวทางสำหรับการเฝ้าระวังอาการด้วยตนเอง

การตรวจพบเร็ว สามารถช่วยชีวิตได้

หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ ภายใน 3 สัปดาห์ (21 วัน)
หลังจากเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ให้ไปพบแพทย์ทันที:



ไข้



ปวดศีรษะ
รุนแรง



อ่อนเพลีย
รุนแรง



คลื่นไส้
และอาเจียน



ปวด
กล้ามเนื้อ



เลือดออกหรือมี
รอยช้ำที่ไม่ทราบสาเหตุ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น และแจ้งบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับประวัติการเดินทางของท่าน

การตรวจพบเร็วและการรักษาอย่างรวดเร็ว สามารถลดความรุนแรงของโรคได้

มาตรการป้องกันโรค

ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่หรือ
เจล
แอลกอฮอล์



หลีกเลี่ยงการ
เดินทาง



ห้ามสัมผัส
สัตว์ป่า
เช่น ค้างคาว
กินผลไม้และลิง



หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับของเหลวใน
ร่างกายของผู้ป่วย
(เลือด, น้ำลาย,
อสุจิ, เสมหะ)



หากท่านเดินทางมาจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก
หรือ ยูกันดา และมีไข้
ให้ไปพบแพทย์ทันที



สแกนเลย



- หากเริ่มมีอาการขณะเดินทาง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- หลังจากเดินทางเข้าประเทศไทย ให้เฝ้าระวังอาการด้วยตนเองเป็นเวลา 3 สัปดาห์
- หากมีอาการ กรุณาติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรายงานอาการของท่านผ่าน QR code

ไวรัสอีโบลา

(Ebola Virus Disease)

เป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ที่ทำลายหลอดเลือด มีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก

อาการ



อ่อนเพลียรุนแรง



ปวดศีรษะ



มีผื่นบนแดง
ขึ้นตามตัว



คลื่นไส้



เลือดออกง่าย
มีตกติ

การติดต่อ



จากคนสู่คน

เลือด น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ
อาเจียน หรืออสุจิของผู้ป่วย
พื้นผิว สัมผัส



จากสัตว์สู่คน

สัตว์ป่าที่ติดเชื้อ เช่น ค้างคาวผลไม้
ลิงชิมแปนซี กอริลลา

การวินิจฉัย



เนื่องจากอาการระยะแรกคล้ายไข้เลือดออก
ไข้มาลาเรีย หรือไข้ไทฟอยด์ แพทย์จำเป็นต้อง
ใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับสูง
เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรม RT-PCR
หรือ การตรวจหาแอนติบอดี เท่านั้น



ป้องกัน



ล้างมือให้สะอาด
ด้วยสบู่และน้ำ
หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ



เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
เลี่ยงการเดินทางไปแหล่ง
ระบาดและไม่คลุกคลีผู้ป่วย



กินร้อน
ช้อนส่วนตัว
ไม่กินเนื้อสัตว์ป่า
และปรุงอาหารให้สุกเสมอ



สวมอุปกรณ์ป้องกัน
หากต้องดูแลผู้ป่วย ต้องใส่
ชุด PPE อย่างมิดชิด



หากมีอาการสงสัย
รีบพบแพทย์ทันที
และแจ้งประวัติการเดินทาง



โรงพยาบาลบางจาก
BANGCHAK HOSPITAL



<https://bangchakhosp.go.th>



02-464-3002-3



โรงพยาบาลบางจาก



โรงพยาบาลบางจาก